



Verhaltensempfehlung nach chirurgischen Eingriffen

1. Wenn auf die Wunde im Mund ein Aufbisstupfer gelegt wurde, nehmen Sie diesen nach einer halben Stunde heraus.
2. Solange die örtliche Betäubung wirkt, nicht essen und trinken.
3. Beim Auftreten von Wundschmerzen nehmen Sie Schmerzmittel nach Bedarf ein.
4. Nach Operationen kommt es zu einer Wundschwellung, die nach 3 Tagen abnimmt. Äußerliches Kühlen vermindert die Schwellung.
5. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und schwere körperliche Arbeit in den ersten 3 Tagen.
6. Bei Nachbluten auf ein sauberes gerolltes Taschentuch, eine Mullbinde oder ähnliches fest beißen, kühlen und Oberkörper hochlagern.
7. Bei anhaltender Blutung oder fieberhafter Schwellung kommen Sie bitte vorzeitig in unsere Praxis.
8. Falls Antibiotika verschrieben wurden, nehmen Sie sie regelmäßig ein.
9. Zähneputzen im Wundbereich erst am Tag nach der Operation beginnen und Rauchen und Alkoholgenuss unbedingt vermeiden.
10. Das Führen eines Fahrzeugs nach der Operation kann ärztlicherseits nicht verantwortet werden.

Wir wünschen Ihnen eine schnelle Genesung!

Ihr Praxisteam
Zahnarztpraxis Reifferscheid